



# Grandes Cultures

## AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

### REGION LORRAINE

Bulletin technique n° 5 du 25 mars 1998

## Céréales

Les plus avancées dans le secteur d'Ancerville (55) arrivent au stade un noeud, les plus tardives se redressent à peine. Dans la majorité des cas, elles sont entre le stade tallage et épi un cm.

### Maladies

Mis à part exception citée dans les précédents bulletins, le **piétin verse** reste discret. La **septoriose** issue des contaminations d'automne et d'hiver est très souvent visible sur les feuilles de la base. Elle n'évoluera que si les conditions de fin mars et d'avril lui sont favorables. Le déficit en eau de ces dernières semaines ne leur ont pas été favorables.

Dans ces conditions, tout traitement est actuellement inutile, sauf si vous observiez de nombreux symptômes de piétin verse, notamment dans les parcelles en blé sur blé ou blé tous les deux ans.

Si tel était le cas, vous pourriez envisager un traitement spécifique vers le stade un noeud en préférant les produits à base de prochloraze qui ont l'avantage d'avoir un effet important sur septoriose.

Nous rappelons que toutes les expérimentations conduites durant les deux dernières années n'ont pas mis en évidence de perte de rendement causée par le piétin verse, même dans les cas d'attaque importante (60 à 70 % de pieds contaminés) mais en l'absence de verse.

### Raccourcisseurs

Avec l'arrivée du stade épi un cm, vous pouvez exécuter vos raccourcisseurs de type Cycocel, actuellement le meilleur rapport efficacité - prix en Lorraine.

Ce traitement est à réserver aux parcelles présentant un risque de verse et doit être appliqué dans des conditions "poussantes" avec si possible des températures supérieures à 10-12°C et avec une humidité suffisante.

Les applications multiples sont à réserver aux parcelles à haut risque de verse et très productives.

## Colza

Les colzas les plus précoces atteignent le stade tige 20 cm. Le bouton accolé est visible.

### Ravageurs

Aucun piégeage de charançon n'est intervenu ces derniers jours. Les traitements spécifiques deviennent inutiles dans de nombreuses situations.

Continuer à surveiller les cuvettes. Quelques méligèthes ont été capturés.

#### Rappel du seuil d'intervention :

- 1 méligèthe par plante en moyenne au stade boutons accolés.
- 2 à 3 méligèthes par plante au stade boutons bien écartés.

Pour faire les comptages, observer attentivement les boutons encore accolés.

Aucun traitement insecticide n'est nécessaire pour l'instant.

### Maladies

La situation est saine dans l'ensemble. Quelques taches de phoma ou d'alternaria sont visibles dans certaines parcelles.

Le moment pour les premiers raccourcisseurs.

